

病害虫情報(第5号)8月予報

令和8年7月30日
神奈川県農業技術センター

病害虫防除部 TEL 0463-58-0333
ホームページ <https://www.pref.kanagawa.jp/docs/cf7/cnt/f450002/>

【内容】

- I 8月の主な病害虫の発生予報、防除要否、使用する薬剤例 1
【水稻、カンキツ、ナシ、ブドウ、カキ、チャ、抑制トマト、抑制キュウリ、促成イチゴ、ナス、ネギ、キャベツ】
II 8月の気象予報と病害虫発生予報の根拠 9

- 農薬使用の際は、必ずラベルの記載事項を確認し、遵守すべき基準を守り、飛散防止に努めましょう。
○ 掲載農薬は一般的な場合を想定し、防除効果を優先して選定しています。
○ 神奈川県総合防除計画を参考にし、化学農薬のみに依存しない防除に努めましょう。
※ 農薬に関する情報は、令和8年7月28日までの農薬登録情報に基づいて記載しています。

I 8月の主な病害虫の発生予報、防除要否、使用する薬剤例

【水稻】

生育:並(普及指導部:はるみ)

病害虫名	発生予報 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ❖防除のポイント
いもち病 (穂いもち)	並	△	(予・治) コラトップ粒剤5 [出穂30日前～5日前,2回] 3～4kg/10a 等
紋枯病	並	○	(予・治) リンバー粒剤 [30日,2回] 3～4kg/10a (予・治) モンカット粒剤 [出穂30～10日前(但し,14日),4回] 3～4kg/10a 等 ❖ 粒剤を使用する場合の防除適期は出穂10日前程度である。
斑点米カメムシ類	並	○	アルバリン又はスタークル粒剤 [7日,3回] 3kg/10a ダントツ粒剤 [7日,3回] カメムシ類:3～4kg/10a ウンカ類、ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ:3kg/10a
ヒメトビウンカ	やや少	△	キラップ粒剤 [14日,2回] カメムシ類、ウンカ類:3kg/10a
セジロウンカ	並	△	エミリアフロアブル [7日,2回] カメムシ類、ウンカ類、ツマグロヨコバイ:1,000倍
トビイロウンカ	並	△	等
ツマグロヨコバイ	並	△	❖ キラップ粒剤は斑点米カメムシ類対策を主として使用する。 ❖ 斑点米カメムシ類の防除には畦畔等の除草が有効だが、水田への飛来を防ぐため、出穂10日前頃から除草は控える。
ニカメイチュウ	並	△	❖ 粒剤を使用する場合の防除適期は出穂7日後と21日後頃、水和剤・乳剤等を使用する場合は出穂10日後と24日後頃である。 ❖ イネカメムシがほ場でみられる場合、出穂期の防除が必要である。発生状況を確認し、適期防除を行う。
スクミリンゴガイ	—	△	❖ 卵塊・貝を見つけた場合は潰して捕殺する。 ❖ 詳細は、以下の防除対策資料を参照すること。 神奈川県スクミリンゴガイ防除対策マニュアル(農業技術センター)

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第5号・8月) …………… 神奈川県農業技術センター

【カンキツ】 生育:並(足柄地区事務所根府川分室:普通温州)

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
黒点病	並	○	(予) ジマンダイセン水和剤 みかん:[30日,4回] 400～800倍 みかんを除くかんきつ:[90日,4回] 600～800倍 (予) ペンコゼブ水和剤 みかん:[30日,4回] 400～800倍 みかんを除くかんきつ:[90日,4回] 600～800倍 等 ☞ 上記2剤は有効成分が同じであるため、どちらかを使用する。 ❖ 前回防除後、累積降水量が250mmを超えた時点で防除を行う。
かいよう病 (中晩柑類)	並	○	(予) コサイド3000 [生育期,ー] 2,000倍 + クレフノン [ー,ー] 200倍 (予・治) カスミンボルドー 又は カップーシン水和剤 + クレフノン [ー,ー] 200倍 みかん:[7日,5回] 1,000倍 みかんを除くかんきつ:[45日,5回] 1,000倍 等 ☞ カスミンボルドー及びカップーシンは混合剤。総使用回数に注意 する。 ❖ 傷口から感染するため、ミカンハモグリガの防除を行い、台風通過が予想 される前には予防散布する。
ミカンハダニ	並	○	ダニゲッターフロアブル [前日,1回] 2,000倍 等
ミカンサビダニ	ー	○	
チャノキイロアザミウマ	やや少	○	トランスフォームフロアブル [前日,3回] 1,000～2,000倍 等
カメムシ類	並	△	スタークル顆粒水溶剤 [前日,3回] 2,000倍 ロディー乳剤 [7日,4回] 2,000倍 等 ❖ 山際の園ではカメムシが飛来する可能性があるので注意する。発生が見 られたらただちに防除する。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【ナ シ】 生育:やや早(生産技術部果樹花き研究課:豊水)

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
うどんこ病	並	○	(予・治) コナケシ顆粒水和剤 [前日,2回] 4,000倍 等
シンクイムシ類	並	○	モスピラン顆粒水溶剤 [前日,3回] 2,000～4,000倍 テルスターフロアブル [前日,2回] シンクイムシ類:3,000倍、カメムシ類:3,000～6,000倍
カメムシ類	並	△	フェニックスフロアブル [前日,2回] シンクイムシ類:4,000倍 等 ❖ 山際の園ではカメムシが飛来する可能性があるので注意する。発生が見 られたらただちに防除する。
ハダニ類	並	○	マイトコーネフロアブル [前日,1回] 1,000～1,500倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) 神奈川県農業技術センター

【ブドウ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
べと病	やや多	○	(予) Zボルドー [発病前～発病初期, -] 500～800倍 + クレフノン [-, -] 100倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【カキ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
うどんこ病	並	○	(予・治) トップジンM水和剤 [前日, 6回] 1,000～1,500倍 (予・治) ベルクート水和剤 [14日, 3回] 1,000～1,500倍 等 ❖ ベルクートは西村早生では薬害を生じるので使用しない。
カキノヘタムシガ	－	○	ダントツ水溶剤 [7日, 3回] 2,000～4,000倍 アルバリン 又は スタークル顆粒水溶剤 [前日, 3回] 2,000倍 フェニックスフロアブル [7日, 2回] カキノヘタムシガ: 4,000倍 等
カメムシ類	並	△	❖ カキノヘタムシガの平年の防除適期は8月上旬である。 ❖ カメムシ類はナシの項を参照する。

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「収穫*日前まで」を「*日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

【チャ】

生育:並(北相地区事務所研究課:やぶきた)

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
ハマキムシ類 チャハマキ チャノコカクモンハマキ	やや少	△	ロディー乳剤 [7日, 1回] チャハマキ: 1,000倍、 チャノコカクモンハマキ: 1,000～2,000倍 マッチ乳剤 [7日, 1回] 2,000～3,000倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

病虫害情報

(令和8年度・第5号・8月) …………… 神奈川県農業技術センター

【抑制トマト】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント										
アブラムシ類	並	○	【育苗期:粒剤施用】 アルバリン 又は スタークル粒剤 [育苗期,1回:株元散布] コナジラミ類:1～2g/株 プリロソノ粒剤オメガ [育苗期後半～定植時,1回:株元散布] 2g/株 【育苗期:散布】 ディアナSC [前日,2回] アザミウマ類:2,500～5,000倍、コナジラミ類:2,500倍 コルト顆粒水和剤 [前日,3回] アブラムシ類、コナジラミ類:4,000倍 マッチ乳剤[前日,4回] コナジラミ類:2,000倍、アザミウマ類:1,000～2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,－] アブラムシ類、コナジラミ類:300倍 ベミデタッチ [前日,－] コナジラミ類:500倍 ☞ ベミデタッチは成虫飛来前や発生初期に使用し、7日間隔で複数回散布する。 【定植前日～定植当日:土壌施用】 モスピラン粒剤 [定植前日～定植当日,1回:株元散布] コナジラミ類:1g/株 【定植後:散布】 グレーシア乳剤 [前日,2回] コナジラミ類、アザミウマ類:2,000倍 モベントフロアブル [前日,3回] 2,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,－] アブラムシ類、コナジラミ類:300倍 ベミデタッチ [前日,－] コナジラミ類:500倍 ☞ ベミデタッチは成虫飛来前や発生初期に使用し、7日間隔で複数回散布する。 ❖ 生育初期にウイルス病に感染すると被害が大きくなるため、育苗期の害虫防除を徹底する。 <table><tr><th>発生するウイルス病</th><th>媒介する害虫</th></tr><tr><td>CMV等(トマトモザイク病)</td><td>アブラムシ類</td></tr><tr><td>TYLCV(トマト黄化葉巻病)</td><td rowspan="2">コナジラミ類</td></tr><tr><td>ToCV(トマト黄化病)</td></tr><tr><td>TSWV(トマト黄化えそ病)</td><td rowspan="2">アザミウマ類</td></tr><tr><td>CSNV(トマト茎えそ病)</td></tr></table> ❖ ウイルス病発病株は抜き取り、土中に埋めるなど適切に処分する。 ❖ 育苗施設内外、本ぽ内外の雑草防除を徹底する。 ❖ 0.4mm目合い以下の防虫ネットを、育苗施設の開口部に展張するか、育苗ベッドにトンネル掛けする。 ❖ 本ぽでは、施設開口部に0.4mm目合い以下の防虫ネットを2重被覆する。	発生するウイルス病	媒介する害虫	CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類	TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類	ToCV(トマト黄化病)	TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類	CSNV(トマト茎えそ病)
発生するウイルス病	媒介する害虫												
CMV等(トマトモザイク病)	アブラムシ類												
TYLCV(トマト黄化葉巻病)	コナジラミ類												
ToCV(トマト黄化病)													
TSWV(トマト黄化えそ病)	アザミウマ類												
CSNV(トマト茎えそ病)													
コナジラミ類 タバコ コナジラミ オンシツ コナジラミ	やや多	○											
	－	○											
アザミウマ類	－	○											

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第5号・8月) …………… 神奈川県農業技術センター

【抑制キュウリ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント									
べと病	－	○	(予) インプレッションクリア [発病前～発病初期,－] うどんこ病:1,000～2,000倍									
うどんこ病	－	○	(予) ランマンフロアブル [前日,4回] べと病:1,000～2,000倍 (予・治) ピシロックフロアブル [前日,3回] べと病:1,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日,－] うどんこ病:300～600倍 等 ❖ 育苗期の殺菌剤散布は、病害予防の効果が高い。但し、高温による薬害に注意する。									
アブラムシ類	並	○	【育苗期:株元施用】 アルバリン 又は スタークル粒剤 [育苗期,1回:株元散布] アブラムシ類:1g/株、コナジラミ類:1～2g/株 プリロッソ粒剤オメガ [育苗期後半～定植時,1回:株元散布] 2g/株									
コナジラミ類 タバココナジラミ	やや多	○	【定植時:粒剤施用】 アドマイヤー1粒剤 [定植時,1回] アブラムシ類、アザミウマ類:[植穴又は株元土壌混和] 1～2g/株 コナジラミ類:[植穴土壌混和] 2g/株									
オンシツ コナジラミ	－		ダントツ粒剤 [定植時,1回:植穴処理土壌混和] アブラムシ類、コナジラミ類:1～2g/株 ミナミキイロアザミウマ:2g/株									
アザミウマ類 ミナミキイロ アザミウマ	やや少	○	【育苗期～定植後:散布】 グレーシア乳剤 [前日,2回] コナジラミ類、アザミウマ類:2,000倍 モベントフロアブル [前日,3回] 2,000倍 コルト顆粒水和剤 [前日,3回] アブラムシ類、コナジラミ類:4,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,－] アブラムシ類、コナジラミ類:300倍 等 ❖ 生育初期にウイルス病に感染すると被害が大きくなるため、育苗期の害虫防除を徹底する。 <table><tr><th>発生するウイルス病</th><th>媒介する害虫</th></tr><tr><td>CMV等(キュウリモザイク病)</td><td>アブラムシ類</td></tr><tr><td>CCYV(キュウリ退緑黄化病)</td><td rowspan="2">コナジラミ類</td></tr><tr><td>BPYV(キュウリ黄化病)</td></tr><tr><td>MYSV、WSMoV (キュウリ黄化えそ病)</td><td>アザミウマ類</td></tr></table> ❖ ウイルス病発病株は抜き取り、土中に埋めるなど適切に処分する。 ❖ 育苗施設内外、本ぽ内外の雑草防除を徹底する。 ❖ 0.4mm目合い以下の防虫ネットを、育苗施設の開口部に展張するか、育苗ベッドにトンネル掛けする。 ❖ 本ぽでは、施設開口部に0.4mm目合い以下の防虫ネットを2重被覆する。	発生するウイルス病	媒介する害虫	CMV等(キュウリモザイク病)	アブラムシ類	CCYV(キュウリ退緑黄化病)	コナジラミ類	BPYV(キュウリ黄化病)	MYSV、WSMoV (キュウリ黄化えそ病)	アザミウマ類
発生するウイルス病	媒介する害虫											
CMV等(キュウリモザイク病)	アブラムシ類											
CCYV(キュウリ退緑黄化病)	コナジラミ類											
BPYV(キュウリ黄化病)												
MYSV、WSMoV (キュウリ黄化えそ病)	アザミウマ類											

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

病虫害情報

(令和8年度・第5号・8月) 神奈川県農業技術センター

【促成イチゴ】

病虫害名	発生予報 (平年比)	防除要否	使用する薬剤例 ❖防除のポイント
炭疽病	—	○	【育苗期】 (予) アントラコール顆粒水和剤 [仮植栽培期,6回] 500倍 (予) キノンドーフロアブル [育苗期,3回] 500～800倍 (予・治) ベルクートフロアブル [育苗期(定植前),5回] 1,000倍 【育苗期:土壌灌注】 (予) フロンサイドSC [育苗期,1回:灌注] 1,000倍、50ml/株 等 ❖ 発病した苗の治療は期待できない。発病株とその隣接株を速やかに処分する。 ❖ 薬剤防除は10～14日間隔でローテーション散布し、発病が見られたら4～7日間隔に短縮する。
うどんこ病	—	○	【育苗期】 (予) サンヨール [前日,6回] 500～1,000倍 (予・治) スコア顆粒水和剤 [前日,3回] 2,000倍 (予・治) ベルクートフロアブル [育苗期(定植前),5回] 1,000倍 (治) カリグリーン [前日,—] 800～1,000倍 (治) サンクリスタル乳剤 [前日,—] 300～600倍 等 ❖ うどんこ病は育苗期からの防除が重要。特に7月に発生が見られた場合は、高温期の防除を徹底する。 ❖ 高温期には、白い粉状の病斑が見られず、赤紫色の壊死斑となるが病原菌は生存している。 ❖ 本ぽに発病株を持ち込まないように、壊死斑も含めて発病葉をできるかぎり除去し、防除を徹底する。
ハダニ類	やや多	○	コテツフロアブル [前日,2回] ハダニ類、シクラメンホコリダニ:2,000倍 アファーム乳剤 [前日,2回] ハダニ類:2,000倍
チャノホコリダニ シクラメンホコリダニ	—	○	サンマイトフロアブル [収穫開始3日前,1回] 1,000～1,500倍 エコピタ液剤 [前日,—] ハダニ類:100倍 サンクリスタル乳剤 [前日,—] ハダニ類:300～600倍 等 ❖ サンクリスタルなどの気門封鎖剤は、ハダニ類が多発している場合、3日程度の間隔で複数回散布する。
ハスモンヨトウ	並	○	コテツフロアブル [前日,2回] 2,000倍 アファーム乳剤 [前日,2回] 2,000倍 プレオフロアブル [前日,4回] 1,000倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
 [使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

病虫害情報 (令和8年度・第5号・8月) …………… 神奈川県農業技術センター

【ナ ス】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
うどんこ病	並	○	(予・治) パンチョTF顆粒水和剤 [前日,2回] 2,000倍 ☞ パンチョTFは混合剤。総使用回数に注意する。 (予・治) ショウチノスケフロアブル [前日,2回] 2,000倍 ☞ ショウチノスケは混合剤。総使用回数に注意する。 (治) サンクリスタル乳剤 [前日,-] 300～600倍 等
アザミウマ類 ミナミキイロ アザミウマ ミカンキイロ アザミウマ	やや少 並	○ ○	ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 ファインセーブフロアブル [前日,3回] 1,000～2,000倍 ダントツ水溶剤 [前日,3回] ミナミキイロアザミウマ:2,000～4,000倍 プレオフロアブル [前日,4回] 1,000倍 等
オオタバコガ	やや多	○	ディアナSC [前日,2回] 2,500～5,000倍 アフーム乳剤 [前日,2回] 2,000倍 トルネードエースDF [前日,2回] 2,000倍 プレオフロアブル [前日,4回] 1,000倍 等
ハダニ類	並	○	スターマイトフロアブル [前日,1回] 2,000倍 カネマイトフロアブル [前日,1回]
チャノホコリダニ	やや多	○	ハダニ類:1,000～1,500倍、チャノホコリダニ:1,000倍 サンクリスタル乳剤 [前日,-] 300～600倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

【ネ ギ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ❖防除のポイント
黒斑病	—	○	(予・治) ベルクート水和剤 [30日,3回] 2,000倍 (予・治) アミスター20フロアブル [3日,4回] 2,000倍 等 ❖ 肥料不足や窒素過多になると発病しやすい。
ネギアザミウマ	並	○	スピノエース顆粒水和剤 [3日,3回] アザミウマ類:2,500～5,000倍、シロイチモジヨトウ:5,000倍
シロイチモジヨトウ	—	○	ファインセーブフロアブル [3日,2回] アザミウマ類:1,000～2,000倍 ハチハチ乳剤 [7日,2回] 1,000倍 トルネードエースDF [14日,2回] シロイチモジヨトウ:1,000～2,000倍 等

[防除要否] ◎:追加防除が必要 ○:通常防除 △:必要に応じて防除 ×:防除の必要なし
[使用時期] 「摘採*日前まで」を「*日」に、「摘採前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報 (令和8年度・第5号・8月) …………… 神奈川県農業技術センター

【キャベツ】

病 害 虫 名	発生 予報 (平年比)	防除 要否	使 用 す る 薬 剤 例 ※防除のポイント
べと病	—	○	(予) Zボルドー [発病前～発病初期, —] 500倍 (予) ランマンフロアブル [3日, 4回] 2,000倍 等 ❖ 育苗期から発生に注意する。 ❖ Zボルドーの薬害が懸念される場合は、クレフノン(100～200倍)を加用する。
ハイマダラノメイガ (ダイコンシンクイムシ)	—	○	【苗地床灌注】 ジュリボフロアブル [は種時～育苗期後半, 1回: 灌注] ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ :1,000倍(苗地床1㎡あたり2L) ☞ ジュリボフロアブルは混合剤。総使用回数に注意する。 【セル成型育苗トレイ 又は ペーパーポット灌注】 ジュリボフロアブル [育苗期後半～定植当日, 1回: 灌注] ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ネギアザミウマ: 200倍 (セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊あたり0.5L) ☞ ジュリボフロアブルは混合剤。総使用回数に注意する。 ベリマークSC [育苗期後半～定植当日, 1回: 灌注] ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、アザミウマ類: 400倍 (セル成型育苗トレイ1箱又はペーパーポット1冊あたり0.5L) ☞ ベリマークSCはプリロッソ粒剤オメガと同じ有効成分のため、 定植時までの処理はどちらか1回とする。 【育苗期後半又は定植時: 粒剤施用】 ダントツ粒剤 ハイマダラノメイガ: [育苗期後半, 1回: 株元処理] 0.5g/株 又は、[定植時, 1回: 植穴処理土壌混和] 1～2g/株 ネギアザミウマ: [育苗期後半, 1回: 株元処理] 0.5g/株 プリロッソ粒剤オメガ [育苗期後半～定植時, 1回: 株元散布] ハイマダラノメイガ: 1g/株、アザミウマ類: 2g/株 ☞ プリロッソ粒剤オメガはベリマークSCと同じ有効成分のため、 定植時までの処理はどちらか1回とする。 【育苗期～定植後: 散布】 アファームエクセラ顆粒水和剤 [7日, 3回] ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ :1,000～1,500倍 ☞ アファームエクセラは混合剤。総使用回数に注意する。 リーフガード顆粒水和剤 [7日, 3回] アザミウマ類、ハイマダラノメイガ: 1,500倍 等 ❖ 育苗期は防虫ネットによる被覆を行う。その際は、地際部に隙間が生じな いよう土や留め具で抑える。 ❖ ハイマダラノメイガは、防虫ネットをべた掛けにすると、植物と資材が接す る部分に卵を産み付け、孵化幼虫が内部に侵入してしまうため、うき掛け をする。
ハスモンヨトウ	並	○	
オオタバコガ	やや多	○	
ネギアザミウマ	—	○	

[防除要否] ◎: 追加防除が必要 ○: 通常防除 △: 必要に応じて防除 ×: 防除の必要なし
 [使用時期] 「収穫* 日前まで」を「* 日」に、「収穫前日まで」を「前日」に省略

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月)

神奈川県農業技術センター

Ⅱ 8月の気象予報と病害虫発生予報の根拠

(1) 8月の気象予報(気象庁 7月21日発表3か月予報)

〈天 気〉

平年と同様に晴れの日が多いでしょう。

〈要素別予報〉

	低い(少ない)	平年並	高い(多い)
気 温	20%	40%	40%
降 水 量	30%	30%	40%
日照時間*	30%	40%	30%

*7月23日発表1か月予報による。

(2) 8月の病害虫発生予報の根拠

作物名	病害虫名	発生量		予 報 の 根 拠
		程度	平年比	
水稻	いもち病 (穂いもち)	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並、日照時間は平年並の予報。(－)
	紋枯病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) 県予察ほ(寺田縄:6月上旬植え、はるみ)における生育は、7月15日時点で、草丈、分けつ数は平年並、葉色はやや濃い。(±) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並、日照時間は平年並の予報。(＋)
	斑点米カメムシ類	少	並	1) 予察灯への誘殺数は、小田原では平年よりやや多く(＋)、海老名、県予察ほ(寺田縄)では平年並(±)、伊勢原では平年よりやや少ない(－)。 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ヒメトビウンカ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) 予察灯への誘殺数は、小田原、海老名、伊勢原、県予察ほ(寺田縄)では平年より少ない。(－) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	セジロウンカ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) 予察灯への誘殺数は、小田原、海老名、伊勢原では平年より少なく(－)、県予察ほ(寺田縄)では平年並(±)。 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)

※「発生量」…………… 程度:甚>多>中>少>無 平年比:多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (＋):多発要因 (－):少発要因

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
水稲	トビイロウンカ	少	並	1) 予察灯への誘殺は見られず、平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ツマグロヨコバイ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) 予察灯への誘殺数は、小田原では平年より多く(＋)、海老名、県予察ほでは平年並(±)、伊勢原では平年より少ない(－)。 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ニカメイチュウ (ニカメイガ)	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が平年並。(±) 3) フェロモントラップへの越冬世代の誘殺は見られず、平年並。(±) 4) 予察灯への誘殺数は、小田原、海老名、伊勢原、県予察ほ(寺田縄)では平年並。(±) 5) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	コブノメイガ	少	並	1) 巡回調査では、発生が見られず平年並。(±) 2) 県予察ほ(寺田縄)では、発生が見られず平年並。(±) 3) 予察灯への誘殺は見られず、平年並。(±) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
カンキツ	黒点病 (果実)	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(根府川)では、春葉は発生が平年より少なく、果実は平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	かいよう病 (果実)	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 県予察ほ(根府川)では、春葉で発生が平年より多く(＋)、果実で発生が平年並(±)。 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	チャノキイロアザミウマ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほ(根府川)の粘着トラップでは、発生が平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ミカンハダニ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－) 2) 県予察ほ(根府川)では、無防除区で発生が平年並(±)、慣行防除区で発生が平年より少ない(－)。 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)

※「発生量」..... 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」..... (＋): 多発要因 (－): 少発要因

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
ナシ	うどんこ病	少	並	1) 巡回調査では、徒長枝での発生は平年よりやや多く(+)、短果枝では平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほ(上吉沢)では、平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	シンクイムシ類	－	並	1) フェロモントラップへの第2世代誘殺数は、県予察ほ(上吉沢)でやや少なく(－)、伊勢原、藤沢で平年並(±)。 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ハダニ類	少	並	1) 巡回調査では、発生は平年並。(±) 2) 県予察ほ(上吉沢)では、発生は平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
ブドウ	べと病	少	やや多	1) 巡回調査では、発生は平年よりやや多い。(＋) 2) 県予察ほ(上吉沢)では、発生が平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
カキ	うどんこ病	－	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
果樹全般	カメムシ類	少	並	1) フェロモントラップへのチャバネアオカメムシの誘殺数は、伊勢原、南足柄、県予察ほ(根府川)では平年より少ない(－)。 2) 予察灯への誘殺数は、県予察ほ(根府川)では平年より少なく、県予察ほ(上吉沢)と山北では平年よりやや少ない(－)。 3) ヒノキ球果上のカメムシ寄生数は、幼虫、成虫ともに平年より多い。(＋) 4) ヒノキ球果におけるカメムシの口針鞘数は、平年並。(±) 5) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)

※「発生量」..... 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」..... (+): 多発要因 (－): 少発要因

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) …… 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
チャ	チャノキイロアザミウマ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 叩き出し調査では、落下虫数が平年並。(±) 3) 県予察ほ(寸沢嵐)の叩き出し調査では、落下虫数が平年よりやや少ない。(－) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	チャノミドリヒメコバイ	中	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 叩き出し調査では、落下虫数が平年並。(±) 3) 県予察ほ(寸沢嵐)の叩き出し調査では、落下虫数が平年よりやや多い。(＋) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ハマキムシ類	少	やや少	1) 叩き出し調査では、落下虫数が平年より多い。(＋) 2) 予察灯(山北)の誘殺数は、平年並。(±) 3) フェロモントラップの誘殺数は、山北、県予察ほ(寸沢嵐)ともに平年よりやや少ない(－)。 4) 県予察ほ(寸沢嵐)では、発生が平年並。(±) 5) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	チャノホソガ	少	並	1) 巡回調査では、発生よりやや少ない。(－) 2) 予察灯(山北)の誘殺数は、平年よりやや少ない。(－) 3) フェロモントラップの誘殺数は、山北で平年より多く(＋)、県予察ほ(寸沢嵐)で平年より少ない(－)。 4) 県予察ほ(寸沢嵐)では、発生が平年よりやや少ない。(－) 5) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	カンザワハダニ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 叩き出し調査では、落下虫数が平年より多い。(＋) 3) 県予察ほ(寸沢嵐)では、発生が平年よりやや少ない。(－) 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
抑制トマト	アブラムシ類	－	並	1) 巡回調査では、ナスで発生が平年より多く(＋)、露地トマトでは発生が平年よりやや少ない(－)。 2) 県予察ほ(上吉沢)の黄色水盤への飛来量は、平年より少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	タバココナジラミ	－	やや多	1) 露地トマトの巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) ナスの巡回調査では、発生が平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)

※「発生量」…………… 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」…………… (＋): 多発要因 (－): 少発要因

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
抑制キュウリ	アブラムシ類	－	並	1) 巡回調査では、ナスで発生が平年より多く(+)、露地トマトでは発生が平年よりやや少ない(－)。 2) 県予察は(上吉沢)の黄色水盤への飛来量は、平年より少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	タバココナジラミ	－	やや多	1) 露地トマトの巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) ナスの巡回調査では、発生は平年並。(±) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ミナミキイロアザミウマ	－	やや少	1) ナスの巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 青色粘着板への誘殺数は、平塚、大磯ともに平年より少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
促成イチゴ	ハダニ類	中	やや多	1) 巡回調査では、育苗期の発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
ナス	うどんこ病	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年並。(±) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(±)
	ミナミキイロアザミウマ	少	やや少	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 青色粘着板への誘殺数は、平塚、大磯ともに平年より少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ミカンキイロアザミウマ	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 青色粘着板への誘殺数は、平塚、大磯ともに平年より多い。(＋) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	ハダニ類	少	並	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや少ない。(－) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
	チャノホコリダニ	少	やや多	1) 巡回調査では、発生が平年よりやや多い。(＋) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)
ネギ	ネギアザミウマ	中	並	1) 巡回調査では、発生が平年より少ない。(－) 2) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。(＋)

※「発生量」..... 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」..... (＋): 多発要因 (－): 少発要因

病害虫情報

(令和8年度・第5号・8月) …… 神奈川県農業技術センター

作物名	病害虫名	発生量		予報の根拠
		程度	平年比	
露地野菜 全般	ハスモンヨトウ (三浦半島地区)	－ (－)	並 (並)	1) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦、横浜、伊勢原ともに平年よりやや少ない。(－) 2) 県予察ほのフェロモントラップへの誘殺数は、上吉沢、三浦ともに平年よりやや少ない。(－) 3) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。 (＋)
	オオタバコガ (三浦半島地区)	－ (－)	やや多 (並)	1) フェロモントラップへの誘殺数は、三浦では平年より少なく(－)、横浜、伊勢原では平年並(±)。 2) 県予察ほのフェロモントラップへの誘殺数は、上吉沢では平年よりやや少なく、三浦では平年より少ない。(－) 3) 巡回調査では、露地トマトで発生が平年より多く(＋)、ナスで発生が平年並(±)。 4) 気温は平年並か高く、降水量は平年並の予報。 (＋)

※「発生量」…………… 程度: 甚>多>中>少>無 平年比: 多>やや多>並>やや少>少
「予報の根拠」………… (＋): 多発要因 (－): 少発要因