

河川のモニタリング調査
平成 27 年度の調査結果
平成 28 年度の調査計画

平成 28 年 7 月
環境科学センター

1 河川のモニタリング調査について

(1) 調査の目的

本調査は、「かながわ水源環境保全・再生施策大綱（平成 17 年度）」及び「第 2 期かながわ水源環境保全・再生実行 5 か年計画（平成 24 年度～28 年度）」に基づき、水源河川の相模川水系及び酒匂川水系において、動植物の生息状況及び水質の状況を調査し、河川環境に関する基礎データを収集することを目的とする。

(2) 調査対象河川

相模川水系及び酒匂川水系

(3) 調査の概要

ア 河川の流域における動植物等調査

施策の効果の評価に活用できる河川環境の変化を把握するため、河川環境を指標する水生生物、河川と関わりのある陸域生物及び BOD、窒素、リン等の水質項目の調査を 5 年ごと実施する。これまでに、第 1 期調査として平成 20 年度に相模川水系、平成 21 年度に酒匂川水系を調査し、第 2 期調査として平成 25 年度に相模川水系、平成 26 年度に酒匂川水系を調査した。

ア) 動植物調査

調査は、「平成 18 年度版 河川水辺の国勢調査 基本調査マニュアル（国土交通省）」に準じて実施する。

調査地点：図 1 の地点（ただし、サンショウウオ類調査は各水系の 25 地点の沢で実施）

調査項目：底生動物、魚類、付着藻類、鳥類、両生類、植物

調査時期及び回数：次表のとおり

対象生物	調査時期及び回数
底生動物、付着藻類	7 月と 12 月の年 2 回
魚類	7～8 月と 12～1 月の年 2 回
鳥類	5～6 月と 1～2 月の年 2 回（繁殖期及び越冬期を考慮）
カエル類	6 月と 2 月の年 2 回（幼生期を考慮）
サンショウウオ類	4～8 月の年 1 回（幼生期を考慮）
植物	6 月と 10 月の年 2 回（開花時期及び結実時期を考慮）

イ) 水質調査

調査は、「公共用水域水質測定計画（神奈川県）」に準じて実施する。

調査地点：図 1 の地点

調査項目：次表のとおり

項目	調査項目
観測項目	天候、流量、気温、水温、色相、透視度、臭気、河川外観（流況）、
測定項目	pH、BOD、COD、SS、DO、全窒素、溶解性全窒素、硝酸性窒素、 亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素、全リン、溶解性全リン、磷酸態リン、 全有機炭素、電気伝導率、付着藻類現存量、

調査時期及び回数：毎月 1 回の年 12 回




図1 調査地点配置図

イ 県民参加型調査

水源環境保全・再生事業の普及啓発を図るとともに、得られたデータにより河川の流域における動植物等調査結果を補完するため、県民から調査員を募って、県民参加により動植物及び水質の調査を毎年実施する。これまでに、第1期調査として平成20年度から23年度の4回、第2期調査として平成24年度から27年度の4回の調査を実施した（第2期調査は平成28年度まで実施）。

調査は、「県民参加型調査マニュアル（環境科学センター）」及び「今後の河川水質管理の指標について（案）（国土交通省）」に基づいて実施する。

調査地点：県民調査員が自由に設定する

調査項目：底生動物、魚類、植物、水質ランク（表1参照）、気温、水温、pH

調査時期及び回数：県民調査員が自由に設定する

表1 水質ランク

ランク	説明	ランクのイメージ	評価項目と評価レベル			
			透視度 (cm)	ゴミの量	水におい	川底の感触
A	籠を川の水につけやすい		100以上	川の中や水際にゴミは見あたらない。または、ゴミはあるが全く気にならない。	不快でない	不快感がない
B	川の中に入って遊びやすい		70以上	川の中や水際にゴミは目につくが、我慢できる。		ところどころヌルヌルしているが不快ではない
C	川の中には入れないが、川に近づくことができる		30以上	川の中や水際にゴミがあって不快である。	不快なおいを感じる	ヌルヌルして気持ちが悪い
D	川の水に魅力がなく、川に近づきにくい		30未満	川の中や水際にゴミがあってとても不快である。	とても不快なおいを感じる	

2 平成 27 年度の結果

(1) 県民参加型調査

ア 応募人数

個人と団体（4 団体）合わせて 81 名の応募があった。

イ 講習会等の開催

講習会等を表 2 のとおり開催した。

表 2 講習会等の開催状況

年度	応募 人数	講習会等の開催回数及び参加延べ人数				調査実施 地点
		現地講習会	室内講習会	講座	意見交換会	
H27	81	5 回 50 人	5 回 47 人	1 回 13 人	2 回 14 人	43
H26	67	5 回 56 人	5 回 55 人	1 回 30 人	2 回 25 人	41
H25	62	4 回 34 人	4 回 38 人	2 回 30 人	2 回 10 人	22
H24	84	5 回 29 人	3 回 28 人	2 回 61 人	2 回 5 人	16
H23	92	5 回 61 人	7 回 50 人	開催なし	2 回 8 人	33
H22	66	4 回 17 人	2 回 17 人	開催なし	1 回 3 人	20
H21	60	3 回 28 人	開催なし	開催なし	1 回 5 人	9
H20	35	5 回 48 人	開催なし	開催なし	1 回 3 人	8



現地講習会



室内講習会

図 2 講習会風景

ウ 調査結果

調査は延べ 43 地点で実施され、動植物調査結果 43 地点分、水質調査結果 31 地点分が提出された。これらの結果について、重複して調査が行われた地点を整理し、33 地点において有効なデータを得ることができた。

調査結果を表 3 に示す。

表3 平成27年度県民参加型調査結果

No.	水系名	調査地点	水質ランク
1	相模川	高田橋付近	B
2	酒匂川	寄 大寺橋上流	A
3	酒匂川	甘柿橋上流	A
4	相模川	平山大橋下流	A
5	酒匂川	立花学園高校直下	B
6	相模川	原当麻駅東入口交差点～新一の沢橋	B
7	酒匂川	東名高速南西約70m	B
8	相模川	第2鮎津橋	B
9	相模川	東八幡橋下流	B
10	相模川	用田橋	-
11	相模川	新小鮎橋	B
12	酒匂川	ミズヒ沢出合下流	A
13	酒匂川	立花学園下流	-
14	酒匂川	西沢	A
15	酒匂川	西沢	A
16	相模川	上大島キャンプ場下流	B
17	相模川	平山大橋下流	A
18	相模川	青山浄水場	A
19	相模川	青野原キャンプ場	A
20	相模川	亀見橋	A
21	相模川	青根緑の休暇村	A
22	相模川	旭町3丁目付近	B
23	酒匂川	立花学園下流	B
24	相模川	新丹保橋	A
25	相模川	鍛冶屋橋	A
26	相模川	日連	A
27	相模川	山下橋	B
28	相模川	吉野	A
29	相模川	新八瀬橋上流	-
30	相模川	座架依橋上流	-
31	相模川	相模川合流点	-
32	相模川	白鷺橋上流	-
33	相模川	目久尻川下流	-

3 主要評価指標の経年変化（参考）

相模川水系においては、平成 20 年度に第 1 期、平成 25 年度に第 2 期の調査を実施し、酒匂川水系においては、平成 21 年度に第 1 期、平成 26 年度に第 2 期の調査を実施した。第 1 期から第 2 期の施策実施期間中の河川環境の変化を把握するため、平均スコア値、多様度指数、特定種の出現状況、BOD、全窒素、全燐について、第 1 期（19～23 年度）から第 2 期（24 年度～28 年度）の経年マップを作成した。

ア 平均スコア値の経年変化

水質及び自然度の評価指標である平均スコア値の経年変化を図 3 に示す。相模川水系では 2 地点で上昇（0.5）し、4 地点でやや低下（0.5～0.6）していた。酒匂川水系では 2 地点でやや上昇（0.5～0.6）し、1 地点でやや低下（0.5）していた。上昇した地点を青色、低下した地点を橙色で示す。




図 3 平均スコア値の経年変化

イ 多様度指数（冬期）の経年変化

生物多様性の評価指標である多様度指数の経年変化を図4に示す。相模川水系では2地点で上昇(0.71~1.05)し、4地点で低下(0.76~1.54)していた。酒匂川水系では1地点で上昇(1.19)し、6地点で低下(0.70~0.98)していた。上昇した地点を青色、低下した地点を橙色で示す。

多様度指数 (H') : 生物多様性の評価指標。底生動物に対して、種数と、それぞれの種に属する個体数を基にして計算される。種類数が多いほど、かつ種ごとの個体数が均等なほど高い値となる。




図4 多様度指数の経年変化

ウ 特定種の出現状況の経年変化

きれいな水質の指標種であるカミムラカワゲラ及びヘビトンボの出現状況の経年変化を図5、6に示す。カミムラカワゲラは、相模川水系では5地点で新たに出現し、5地点で出現がなくなり、酒匂川水系では4地点で新たに出現し、4地点で出現がなくなった。ヘビトンボは、相模川水系では2地点で新たに出現し、3地点で出現がなくなり、酒匂川水系では4地点で新たに出現し、4地点で出現がなくなった。新たに出現があった地点を青色、出現がなくなった地点を橙色で示す。




図5 カミムラカワゲラ出現状況の経年変化




図6 ヘビトンボ出現状況の経年変化

エ BOD の経年変化

有機汚濁の評価指標である BOD の経年変化を図 7 に示す。相模川水系では、5 地点で低下 (0.3~0.7mg/l) し、1 地点でやや上昇 (0.4mg/l) していた。酒匂川水系では、3 地点で低下 (0.3~2.3mg/l) していた。低下した地点を青色、上昇した地点を橙色で示す。




図 7 BOD の経年変化

オ 全窒素の経年変化

富栄養化の評価指標である全窒素の経年変化を図 8 に示す。相模川水系では、7 地点でやや低下 (0.40~0.90mg/l) し、1 地点でやや上昇 (0.40mg/l) していた。酒匂川水系では、4 地点で低下 (0.42~1.50mg/l) していた。低下した地点を青色、上昇した地点を橙色で示す。




図 8 全窒素の経年変化

カ 全燐の経年変化

富栄養化の評価指標である全燐の経年変化を図9に示す。相模川水系では、6地点でやや低下(0.010~0.030mg/l)し、3地点でやや上昇(0.010~0.026mg/l)していた。酒匂川水系では、3地点で低下(0.010~0.208mg/l)し、2地点でやや上昇(0.011~0.025mg/l)していた。低下した地点を青色、上昇した地点を橙色で示す。




図9 全燐の経年変化

4 平成28年度の調査計画

平成28年度も、県民参加型調査を実施する。

より精度の高い平均スコア値が得られるよう講習会内容及び講座内容の充実を図る。

第2期調査の年次計画を表4に示す。

表4 第2期調査の年次計画

		取組内容	H24	H25	H26	H27	H28
河川の流域 における動 植物調査	相模川	調査計画の策定	○				
		現地調査		○			
		結果のとりまとめ		○			
	酒匂川	調査計画の策定		○			
		現地調査			○		
		結果のとりまとめ			○		
県民参加型 調査	調査の実施	○	○	○	○	○	