


# 鶏を飼養する農場の皆様へ 農場内の緊急消毒をお願いします

県は家畜伝染病予防法に基づく緊急消毒を公示しました。  
農場・鶏舎等の周囲、農場入口等について速やかに消毒を実施してください。  
シーズン中は定期的に消石灰の散布等による消毒をお願いします。

## ○消石灰の散布方法

- 鶏舎周囲と飼養衛生管理区域の境界に消石灰を散布してください。
- 散布量の目安は、1㎡当たり0.5～1.0kg(2m幅の場合、1袋で約10～20m)です。
- 消石灰は強アルカリ性のため、マスク・手袋等を着用して散布してください。
- 立地等の理由で、消石灰を散布できない場合は、液体の消毒薬の散布を行う等の対応をお願いします。



## ○消石灰の消毒効果

- 粉の消石灰は、地面に落ちた野鳥の糞便等のウイルスを死滅させるには適していますが、付着した病原体を死滅させるまでには長時間を要します。
- 短時間での効果はないので、タイヤや長靴の消毒を行うことには適しません。病原体の持ち込みを防ぐために、踏み込み消毒槽や車両消毒には、液体の消毒薬を用いましょう。
- 消石灰は、繰り返し雨や水に濡れてしまうと、消毒効果がなくなります。定期的に散布し直すことが必要です。



神奈川県では約110万頭の鶏が飼養されています。  
彼らのいのちを病気から守るために、  
ご協力をお願いします。

神奈川県県央家畜保健衛生所 046-238-9111  
神奈川県湘南家畜保健衛生所 0463-58-0152

# 鶏を飼養する農場の皆様へ 飼養衛生管理の再徹底をお願いします

- 早期発見・早期通報の徹底
- 鶏舎の防鳥ネットの隙間及び破損個所の確認及び修繕
- 堆肥舎及び飼料保管庫等の防鳥ネットの設置
- 農場専用の衣服及び靴の使用
- 家きん舎ごとの専用の靴の使用
- 農場入口及び家きん舎出入口付近での手指消毒
- 集卵・集糞ベルトの家きん舎外への開口部の隙間の確認と対策
- 靴等の洗浄消毒 ※踏込消毒槽は消石灰より即効性のある液体消毒薬を使用しましょう。
- ネズミ対策
- 衛生管理区域の出入りの際の車両消毒
- 農場及び家きん舎周辺の整理整頓及び消毒  
※小動物の隠れ場所をなくしましょう
- 家きん舎周囲の樹木の剪定及び消石灰散布等の消毒の徹底

神奈川県畜産課のページも定期的にご覧ください。

※下のコードか、神奈川県トップページから、ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 畜産業 > 鳥インフルエンザ情報(鶏等の家きん飼養者の方へ)よりアクセスしてください。

